

DECITABINUM (DACOGEN)

Indicatii:

- varsta >65 ani
- nou diagnosticiati cu leucemie acuta mieloblastica (de novo/secundara)
- nu sunt candidati pentru chimioterapia standard de inductie
- fara comorbiditati cardiace (ICC severa sau boala cardiac instabila clinic)

Contraindicatii:

- hipersensibilitate la decitabina sau excipienti
- insuficienta cardiaca congestiva severa
- boala cardiaca instabila clinic

Documente necesare:

INITIERE TRATAMENT

- hemoleucograma (hemoglobina, hematocrit, numar leucocite, numar trombocite) + formula leucocitara
- teste biochimice: ALT, AST, bilirubina, uree, creatinina
- examen medular ± citochimie /imunfenotipare
- consult cardiologic
- scrisoare medicala sau bilet de externare in care sa fie mentionat motivul pentru care pacientul nu poate primi chimioterapie standard.
- declaratie de acceptare a tratamentului cu semnatura pacientului
- copie dupa buletin/carte de identitate
- dovada de asigurat
- referatul de necesitate completat corect, complet si actualizat (nu se admit adnotari pe referate mai vechi):
 - o diagnostic complet; specificarea tipului de indicatie (initiere tratament)
 - o doza de administrat administrat [doza totala pe luna (numar flacoane)]
 - o lunile pentru care se face solicitarea

CONTINUARE TRATAMENT:

- hemoleucograma (hemoglobina, hematocrit, numar leucocite, numar trombocite) + formula leucocitara
- teste biochimice: ALT, AST, bilirubina, uree, creatinina
- scrisoare medicala sau bilet de externare cu evolutia sub tratament
- copie dupa buletin/carte de identitate
- dovada de asigurat
- referatul de necesitate completat corect, complet si actualizat (nu se admit adnotari pe referate mai vechi):
 - o diagnostic complet; specificarea tipului de indicatie: continuare tratament
 - o doza de administrat [doza totala pe luna (numar flacoane)]
 - o lunile pentru care se face solicitarea