

Limfomul Hodgkin și vaccinarea

Pacienții diagnosticați cu Limfom Hodgkin sunt încurajați să se vaccineze antigripal și împotriva Coronavirusului. De asemenea, se recomandă respectarea măsurilor pentru evitarea infecției cu Coronavirus. Pacienții care primesc terapie pentru limfomul Hodgkin pot avea răspuns scăzut la vaccinare. Cu toate acestea, se recomandă vaccinarea, atât pentru pacienți, cât și pentru rudele acestora sau îngrijitorii lor. Au fost raportate rate înalte de mortalitate și morbiditate în rândul acestor pacienți hematologici.

Pacienții care au primit autotransplant de celule stem în primele 3-6 luni, pacienții cu Neutrofile sub 500/mm³, Limfocite < 200/mm³, cei care au primit anticorpi anti CD20, doze mari prednisone > 2mg/kg/zi sau au primit regimuri chimioterapiece multiple, au răspuns scăzut la vaccinare. Pe 12 august 2021 FDA a aprobat folosirea dozei 3 cu același vaccin, Pfizer sau Moderna, la pacienții imunodeprimați și cei care au primit transplant de organe solide.

<https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-hodgkin-lymphoma>