

## Aspirină sau tratament anticoagulant pentru prevenirea evenimentelor trombotice post-vaccinale ?

- **NU se recomandă** utilizarea aspirinei sau a tratamentului anticoagulant în scop profilactic înainte sau după vaccinarea cu niciunul dintre vaccinurile anti-COVID-19.
- **Evenimente trombotice post-vaccinale apar prin mecanism imun - VITT\***. Administrarea aspirinei sau tratamentul anticoagulant nu influențează apariția acestora.
- În plus, **tratamentul antiagregant/anticoagulant predispune la un risc mai mare de sângerare** din cauza trombocitopeniei asociate.

\***VITT** - tromboză cu trombocitopenie imună indusă de vaccin, complicație observată în câteva cazuri după folosirea preparatelor Astra- Zeneca și Johnson & Johnson.

### References

1. European Medicines Agency. **AstraZeneca's COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets**. 7 Aprilie 2021. 2. World Health Organization. **WHO statement on AstraZeneca COVID-19 vaccine safety signals**. 17 March 2021
2. <https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-blood-clotting-information-for-healthcare-professionals/information-for-healthcare-professionals-on-blood-clotting-following-covid-19-vaccination>
3. Centers for Disease Control and Prevention. Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States. Available at: <https://www.cdc.gov/>. Last update: 27 Aprilie 2021.